Asthme aigu grave ou Exacerbation aiguë d'asthme ou Aggravation de crise d'asthme aigu

Dr Papa GUEYE
SAMU 972 CHU de Martinique Fort-de-France

Cas clinique

- Femme de 35 ans
- Crise d'asthme la veille, résolutive partiellement
- Récidive de crise ce matin ne cédant pas après plusieurs bouffées de ventoline
- Injection de Bricanyl par un médecin de SOS
- Appel au 15 devant l'aggravation de la crise

Examen initial

- Agitée avec des épisodes de somnolence (GCS 11)
- FR 32/min, SpO2 90 % en AA
- FC 135/min, PA 130/70 mmHg
- **Quels sont les autres signes de gravité à rechercher?**

Examen clinique chez cette patiente

- Somnolente, en sueurs
- Impossibilité à parler ou à compter jusqu'à 10
- Tirage sus sternal et sus claviculaire
- Silence auscultatoire

- **Autres signes cliniques à rechercher**
- Fièvre
- Signes d'IVD aiguë

En dehors de l'asthme , quels autres diagnostics peut-on évoquer?

- Corps étranger ou sténose trachéale
- Lésions laryngées aiguës
- Pneumopathie interstitielle diffuse
- Pneumothorax compressif
- Insuff resp aigue sur insuff respir chronique
- Dyspnée anxiogène

GDS par le SAMU

- pH: 7,15
- PaCO₂: 60 mmHg
- PaO₂: 89 mmHg
- HCO₃⁻: 20 mmol/l
- BE: -5
- SaO₂: 89 en AA
- ECG par le SAMU

- Echographie cardiaque aux Urgences

Paramètres de surveillance

- Conscience, coopération
- Signes de lutte
- FR, SpO2
- FC, PA
- Auscultation pulmonaire
- **DEP**

Evolution non favorable aux Urgences

- Poursuite des B2 mimétiques en aérosol?
- Béta2 mimétiques par voie IV?
- Injection lente de $MgSO_4$ (1 à 2 Amp)?

Autres traitements non conventionnels

- Hélioxy
- Halogénés
- Kétamine

Qui appelle le Réanimateur?

- Tous dans la salle appellent le Réanimateur

Transfert en Réanimation

- **Sortie à J2 , transfert en Pneumologie**
- **Traitement de sortie**
 - Corticithérapie PO pendant 5 jours (Cortancyl 60 mg/j)
 - Broncho-dilatateurs inhalé d'action prolongée (Sérétide 500 X2)
 - B2 mimétique inhalé en cas de crise (Ventoline)
 - **Prescription d'un dispositif de DEP**

Modalités de sortie de l'hôpital

Recommandations écrites au patient

- **Prise correcte de son traitement de sortie**
- **Prise quotidienne du traitement de fond si asthme persistant**
- **Technique de prise des inhalateurs (support écrit)**
- **Technique de surveillance du DEP matin et soir**
- **Reconnaître les prémices d'une nouvelle crise et CAT**
- **Contact précoce avec son médecin traitant ou pneumologue**
- **Appel précoce au 15 si non amélioration ou aggravation**

Conclusion

- Asthme grave voire très grave
- Hospitalisation en Réanimation avec une Evolution favorable
- Bronchospasme associé ou prédominant
- Facteur déclenchant non identifié (mais à chercher)
- Allergène? Infectieux? Viral? Stress psychologique?
- Contexte d'asthme instable
- **Filière des asthmes sévères**

Asthme - Définition

- Syndrome caractérisé par
- Une inflammation chronique des bronches (mastocytes et éosinophiles)
- Une réactivité bronchique anormalement accrue
- Une obstruction bronchique diffuse réversible

Prise en charge de l'asthme aigu grave

TERMINOLOGIE

ASTHME AIGU

Crise d'asthme

Attaque d'asthme : exacerbation

État de mal asthmatique
Crise soudaine et grave

Asthme aigu grave
(near fatal asthma)

ASTHME Difficile

ASTHME CHRONIQUE

oppression thoracique
transitoire

Sifflements expiratoires

Toux

Circonstances déclenchantes

Nuit, Effort, infections,
allergènes, irritants...

ASTHME sévère

Physiopathologie

Mécanisme de l'obstruction bronchiolaires et petites bronches

- Constriction des muscles lisses
- Œdème inflammatoire de la muqueuse
- Hypersécrétion bronchique

Physiopathologie

Augmentation des résistances et effondrement des débits

- Chute du VEMS et du débit expiratoire
- de pointe
- Trapping gazeux: augmentation du volume résiduel, de la capacité résiduelle fonctionnelle et de la capacité pulmonaire totale
- Diminution de la capacité vitale
- Apparition d'une pression expiratoire positive intrinsèque (auto-PEP)

Physiopathologie

Conséquence hémodynamique

- Augmentation du retour veineux et de la postcharge du ventricule droit
- Gène à l'éjection du VD qui se dilate
- Bombement septal gênant le remplissage du VG
- Post charge du VG augmentée
- Pouls paradoxal: baisse inspiratoire de la PA par rapport à l'expiration

Physiopathologie

Conséquences sur les échanges gazeux

- Hyperventilation au stade de début
 - **Hypocapnie**
- Hypoventilation alvéolaire inhomogène
 - **Norno voire hypercapnie (signe d'épuisement)**
- Diminution des rapports ventilation/perfusion
 - **Hypoxémie si augmentation de l'effet shunt**

Altération de la mécanique respiratoire

Frein expiratoire : respiration lèvres pincées

Contraction permanente des muscles inspiratoires :
corde des sternocléidomastoïdiens

Expiration active :
contraction des muscles abdominaux

Altération de la mécanique respiratoire

Efforts inspiratoires très importants :
mise en jeu de tous les muscles inspiratoires
(pression pleurale très négative)

Hématose au cours de l'AAG

Relation obstruction bronchique et PaO₂ Relation obstruction bronchique et PaCO₂

Mac Fadden. N Engl J Med 1968

Pronostic à court terme de l'asthme grave

- 132 épisodes d'AAG
- 36% d'intubation
- **Décès = 11/132 (8,3%) (21% si intubation)**

	Non décédés	Décédés	p
Age	41,5± 14,9	46,5 + 15,8	0,2964
Hommes	24	0	
Femmes	97	11(10,2)	
pH	7,27 + 0,12	7,09 + 0,12	<0,0001
PaCO2	47,8 + 19,1	63,8 + 21,3	0,0101
Score APACHE II	15,2 + 6,8	25,8 + 8,9	<0,0001

Afessa B et coll. Chest 2001;120:1616-1621

Facteurs de mauvais pronostic d'évolution

Facteurs psycho-sociaux

- Non observance, rendez-vous manqués
- Difficultés d'accès aux soins
- Méconnaissance de la maladie, de l'attitude
- Antécédent de séjour aux soins intensifs
- **Médicaux:**
 - maladie psychiatriques, toxicomanie..
 - Obésité

Facteurs de mauvais pronostic d'évolution

Facteurs liés à une PEC inadéquate

- Méconnaissance de la maladie, de l'usage du Peak Flow.
- Absence ou crainte des corticoïdes

Critères d'asthme sévère chronique

- Antécédents de séjour en Réa ou Soins Intensifs
- Consultations répétées aux Urgences
- Utilisation importantes de B2 mimétique

CRITERES DE GRAVITE : de la clinique à la physiopathologie

TABLEAU CLINIQUE

Inspection , examen,
données complémentaires (DEP, gazo)

Obstruction bronchique sévère

- Conséquences respiratoires

Aspect général du patient

- Conséquences hémodynamiques

Examen clinique

ASTHME GRAVE CRITERES DE GRAVITE

Aspect général du patient

- Difficulté à parler ou tousser
- utilisation des muscles respiratoires accessoires (SCM)
- Fréquence respiratoire $> 30/mn$
- orthopnée et sueurs
- Angoisse
- Agitation
- cyanose (tardive)

ASTHME GRAVE

CRITERES DE GRAVITE

Examen clinique

– Signes respiratoires

» Sibilances ? (valeur des sibilances aux 2 temps)

• *Schim CS et coll. Arch Intern Med 1983*

» Silence auscultatoire

- Signes hémodynamiques

- Fréquence cardiaque $> 120/\text{mn}$
- Pouls paradoxal $> 20 \text{ mm Hg}$ (*pouls l'inspiration*)
- collapsus ou choc
- signes d'IVD

ASTHME GRAVE CRITERES DE GRAVITE

- **Mesure du DEP (F 400-500l/mn, H 500-700l/mn)**
 - Inférieur à 150 l/mn voire infaisable (<50% théorique)
 - Possibilité d'aggravation du bronchospasme

Lemarchand P. et coll. Chest 1991

- **Utilité ++ en surveillance immédiate (absence d'amélioration ou de courte durée < 2heures)**

ASTHME GRAVE CRITERES DE GRAVITE

- Corrélation clinique - obstruction bronchique

*Brenner et coll
Am J Med 1983*

Traitement de l'Asthme Grave

• MOYENS DU TRAITEMENT :

- B₂ mimétiques
- corticoïdes
- autres traitements : O₂, anticholinergiques, théophylline...

• MODALITES DE PRISE EN CHARGE :

- critères d'hospitalisation
- réanimation
- Prévention des récurrences

β 2 mimétiques

Clef de voûte du traitement :

- rapidité d'action
- effets secondaires mineurs (hypokaliémie, tachycardie...)
- rare contre-indications (TDR cardiaque)
- absence de tachyphylaxie (*Salmeron - J.E.U.R. 1988*)
- Controverse consommation β 2 mimétiques et mortalité par AAG ? (*Suissa - A.J.R.C.C.M. 1994; 149 : 604-610*)

CAT pratique

- **β 2 inhalés à forte dose en attendant le SAMU**
 - 2 bouffées dans la chambre à répéter 3 à 4 fois à 5 min d'intervalle
 - solumédrol° 60-120 mg IV ou IM
 - si β 2 impossible, 0,2 à 0,5 mg Adrénaline s/c
- en SMUR ou SAMU
 - nébulisation de Ventoline ou Bricanyl (10 mg)**
 - + Atrovent (si signe de gravité d'emblée)**
 - 02 : 6 litres/min
 - si échec (évaluation à 15 min , DEP + 50 l/min)
 - salbutamol IV 1 mg/heure SE?
 - adrénaline IV 1 mg/heure si IVD aiguë et Hypotension?

B2 Agonistes inhalés vs IV

Rapidité d'action et relation dose - effet des voies inhalée et sous-cutanée

Dulfano, Glass, 1976

B Agonistes inhalés vs IV

Supériorité de la voie inhalée dans l'AAG hypercapnique

N = 47

NEB Group IV Group

Salmeron, AJRCCM 1994

Association thérapeutique Synergique

Bénéfice de l'association aux $\beta 2$ agonistes dans les formes les plus graves

Gaz vecteur des aérosols

- O₂ avec objectif de SpO₂ 94 -95%
- Interface adaptée
- Importance du débit généré (6-8 l/min)

Amélioration moins importante du DEP sous O₂

Rodrigo et al Chest 2003

Corticoïdes IV ou Per os

Délat d'action similaire de 3 à 4 heures pour les voies orale et IV

Ellul Micallef 1975

Importance de la corticothérapie de courte durée

Prevention des rechutes après consultation aux urgences:

Ventilation Mécanique

Eviter l'intubation oro-trachéale doit rester un objectif important

L'indication est clinique

- **Arrêt cardiaque**
- **Epuisement avec troubles neurologiques**
- **Absence de réponse après un traitement bien conduit**

Ventilation Mécanique

- Ventilation sous sédation++ et curarisation au début
- Ventilation à petit Vol courant (ou à Pression contrôlée basse et Fréquence basse)
- **Complications potentielles**

Ventilation Non Invasive

L'application d'une PEP externe permet de s'opposer à la PEP Int, de réduire le travail respiratoire et d'améliorer le rapport vent/perf

L'indication pourrait se discuter

- $FR > 25$ /min
- $FC > 110$ /min
- Utilisation des muscles accessoires
- Hypoxémie modérée: $PaO_2/FiO_2 > 200$ mmHg
- Hypercapnie modérée < 60 mmHg

*Soroksky A et al Eur Resp Rev 2010
Galindo-Filho V?C. et al Resp Care 2013
Palin M et al Crit Care 2014*

Take Home Message

- **Asthme grave: crise inhabituelle/obstruction bronchique sévère/pronostic vital engagé**
- **Se méfier des pièges diagnostiques**
- **Stratégie thérapeutique basé sur la voie inhalée**
- **Se donner du temps: évolution après 3 aérosols**

Take Home Message

- Les traitements IV ou adjuvants ne sont pas supérieurs
- Indication de la ventilation mécanique d'emblée est rare
- Place de la VNI avant l'épuisement respiratoire n'est pas validé dans le dernier GINA 2018
- Education et adéquation du traitement au long cours
- Nécessité de Filière d'asthme sévère

4^{ème} FORUM DE L'URGENCE

1^{er} DÉCEMBRE 2018

LA CRÉOLE BEACH HÔTEL
LE GOSIER

Sous la présidence d'honneur
du Dr Christian FORBIN

**Merci pour votre
attention**